

NOBIVAC® CHP



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Vaccin reconstitué :

Une dose de 1 ml contient :

Substances actives :

Virus de la maladie de Carré atténué, souche Onderstepoort au minimum 10^4 DICC₅₀*

Adénovirus canin (CAV2) atténué, souche Manhattan au minimum 10^4 DICC₅₀*

Parvovirus canin atténué, souche INT154 au minimum 10^7 DICC₅₀*

* DICC₅₀ : dose infectieuse sur culture cellulaire.

Forme pharmaceutique:

Lyophilisat et solvant pour suspension injectable.

Espèce cibles:

Chiens.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les chiens, immunisation active destinée à la :

- prévention de la mortalité et des signes cliniques causés par le virus de la maladie de Carré.
- prévention de la mortalité et des signes cliniques liés à l'hépatite canine contagieuse.
- réduction des signes cliniques et de l'excrétion virale lors de l'affection respiratoire due à l'adénovirus canin de type 2.
- prévention de la mortalité, des signes cliniques ainsi que de l'excrétion virale liés au parvovirus canin.

Mise en place de l'immunité :

- 1 semaine pour la maladie de Carré, démontrée par épreuve virulente ;
- 1 semaine pour la parvovirose, démontrée par suivi sérologique et mise en évidence d'un titre protecteur ;
- 1 semaine pour l'hépatite contagieuse et l'affection respiratoire due à l'adénovirus canin de type 2, démontrée par épreuve virulente.

Durée d'immunité :

- 3 ans pour la maladie de Carré et l'affection respiratoire due à l'adénovirus canin de type 2, démontrée par épreuve virulente ;
- 3 ans pour l'hépatite contagieuse et la parvovirose, démontrée par épreuve virulente.

Contre-indications:

Aucune.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux:

Ne vacciner que des chiens en bonne santé et préalablement déparasités.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Utiliser un matériel d'injection stérile et respecter les conditions habituelles d'asepsie.

Autres précautions:

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité):

Dans de rares cas, une réaction d'hypersensibilité de type anaphylactique caractérisée par un dème facial limité a pu être observée

après la vaccination ; à chaque fois, celle-ci était modérée et sans gravité.
Un dème diffus localisé et transitoire peut survenir au point d'injection.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

L'innocuité de la vaccination a été démontrée chez les femelles gestantes.

Interactions médicamenteuses et autres:

Des données d'innocuité et d'efficacité sont disponibles démontrant que ce vaccin peut être mélangé et administré, par voie sous-cutanée, avec des vaccins inactivés de la gamme NOBIVAC® contre la rage et la leptospirose canine due à une ou plusieurs des souches de leptospirose suivantes : *L. interrogans* séro-groupe *canicola* sérovar *canicola*, *L. interrogans* séro-groupe *icterohaemorrhagiae* sérovar *copenhageni*, *L. interrogans* séro-groupe *australis* sérovar *bratislava*, et *L. kirschneri* séro-groupe *grippotyphosa* sérovar *bananal/lianguang*.

Des données d'innocuité et d'efficacité sont disponibles démontrant que ce vaccin peut être administré, non mélangé, le même jour que les vaccins vivants de la gamme NOBIVAC® contenant *Bordetella bronchiseptica* et le virus Parainfluenza canin administrables par voie intranasale.

Aucune information n'est disponible concernant l'innocuité et l'efficacité de ce vaccin lorsqu'il est utilisé avec un autre médicament vétérinaire, excepté les produits mentionnés ci-dessus. Par conséquent, la décision d'utiliser ce vaccin avant ou après un autre médicament vétérinaire doit être prise au cas par cas.

Posologie:

Administrer une dose de 1 ml, par voie sous-cutanée.

Primovaccination :

- chiots de moins de 12 semaines :

. 1^{re} injection à partir de la 8^e semaine d'âge.

. 2^e injection 3 à 4 semaines plus tard, mais pas avant la 12^e semaine d'âge.

- chiots de plus de 12 semaines et adultes : une injection.

Rappel : tous les 3 ans.

voie d'administration:

Voie sous-cutanée.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):

Aucun effet indésirable autre que ceux mentionnés à la rubrique "Effets indésirables (fréquence et gravité)" n'a été observé après injection de 10 fois la dose.

Temps d'attente:

Sans objet.

Propriétés pharmacologiques:

Chez les chiens, la vaccination induit une immunisation active contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse due à l'adénovirus canin de type 1, la parvovirose et les affections respiratoires dues à l'adénovirus canin de type 2, démontrée par épreuve virulente et par la présence d'anticorps.

Incompatibilités:

Ne pas mélanger avec d'autres médicaments excepté avec le solvant NOBIVAC® SOLVANT Canins-Félins et les vaccins NOBIVAC® LEPTO, NOBIVAC® RAGE.

Durée de conservation:

2 ans.

Après reconstitution : à utiliser immédiatement.

Précautions particulières de conservation selon pertinence:

Conserver à une température comprise entre +2°C et +8°C et à l'abri de la lumière.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:

INTERVET
Rue Olivier de Serres
BP 17144
49071 BEAUCOUZÉ cedex

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:

FR/V/8253844 8/1986 - 28/11/1986

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance:

À ne délivrer que sur ordonnance.

Classification ATC Vet:

QI07AD02

Boe de 10 ampoules de vaccin + solvant
GTIN : 08713184056801

Boe de 50 ampoules de vaccin + solvant
GTIN : 08713184055804

Boe plastique de 10 ampoules de vaccin + solvant
GTIN :

Boe plastique de 50 ampoules de vaccin + solvant
GTIN :

MSD SantAnimale

Rue Olivier de Serres
B.P. 17144
49071 BEAUCOUZE CEDEX
Tél : 02.41.22.83.83
Fax : 02.41.22.83.00

www.msd-sante-animale.fr

