

Liste des vaccins antirabiques autorisés en France

Nom du médicament, forme pharmaceutique	Titulaire de l'AMM	Type de procédure/date d'AMM	Substances actives	Espèces cibles	Posologie et voie d'administration
CANIGEN CH(A2) LR, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable	VIRBAC	Nationale 08/12/1982	adenovirus canin, leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, virus de la maladie de carré, virus rabique	Chien	Après reconstitution du lyophilisat à l'aide de la suspension, administrer par injection sous-cutanée une dose de vaccin selon le schéma vaccinal suivant : Primo-vaccination : une injection de CANIGEN CH/L suivie d'une injection de CANIGEN CH(A2)LR 3 à 4 semaines plus tard. L'injection de CANIGEN CH(A2)LR ne doit pas se faire avant 3 mois d'âge. Vaccination de rappel : une injection annuelle de CANIGEN CH(A2)LR.
CANIGEN CHPPi/LR, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable	VIRBAC	Nationale 05/11/1990	adenovirus canin, leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, parvovirus canin, virus de la maladie de carré, virus parainfluenza canin, virus rabique	Chien	Après reconstitution du lyophilisat à l'aide de la suspension, administrer par injection sous-cutanée une dose de vaccin selon le schéma vaccinal suivant : Primo-vaccination : à partir de 8 semaines d'âge, une injection de CANIGEN CHPPi/L suivie d'une injection de CANIGEN CHPPi/LR 3 à 4 semaines après. L'injection de CANIGEN CHPPi/LR ne doit pas se faire avant 3 mois d'âge. Vaccination de rappel : une injection annuelle de CANIGEN CHPPi/LR.
CANIGEN LR, Suspension injectable	VIRBAC	Nationale 03/01/1983	leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, virus rabique	Chien	Administrer par injection sous-cutanée une dose de vaccin selon le schéma vaccinal suivant : Primo-vaccination : à partir de 8 semaines d'âge, une injection de CANIGEN L suivie d'une injection de CANIGEN LR 3 à 4 semaines plus tard. L'injection de CANIGEN LR ne doit pas se faire avant l'âge de 3 mois. Vaccination de rappel : une injection annuelle de CANIGEN LR.
ENDURACELL 7 + R Mono, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable	ZOETIS FRANCE	Nationale 26/10/1989	adenovirus canin, leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, parvovirus canin, virus de la maladie de carré, virus parainfluenza canin, virus rabique	Chien	Chaque dose est préparée en mélangeant un flacon de lyophilisat avec un flacon de suspension leptospire et en ajoutant la suspension obtenue à la fraction rage. Le vaccin ainsi constitué doit être mélangé doucement et injecté immédiatement par voie sous-cutanée. Primovaccination : Affections virales : une injection de ENDURACELL 7+R MONO à partir de 3 mois d'âge. Leptosiroses : pour une protection contre les leptosiroses, une 2ème injection 14 à 21 jours plus tard est nécessaire avec un vaccin contenant des leptospires de la gamme ENDURACELL. Rappels : Administrer une dose unique tous les ans.

En date du 20 février 2015

Liste des vaccins antirabiques autorisés en France

ENDURACELL 8, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable	ZOETIS FRANCE	Nationale 14/03/1995	adenovirus canin, leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, parvovirus canin, virus de la maladie de carré, virus parainfluenza canin, virus rabique	Chien	Chaque dose est préparée en mélangeant un flacon de lyophilisat avec un flacon de suspension. Le vaccin ainsi constitué doit être mélangé doucement et injecté par voie sous-cutanée. 1 dose de 1 ml suivant les modalités suivantes : Primovaccination : A partir de 8 semaines d'âge, 1ère injection avec ENDURACELL 7 (CA2PPi/L) 2ème injection 1 mois plus tard avec ENDURACELL 8 (CA2PPi/LR) Rappel : annuel avec ENDURACELL 8 (CA2PPi/LR)
ENDURACELL LR, Suspension injectable	ZOETIS FRANCE	Nationale 19/03/1990	leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, virus rabique	Chien	Bien agiter le flacon avant utilisation. 1 dose de 1 ml par voie sous-cutanée selon les modalités suivantes : Primo-vaccination : Rage : 1 dose à partir de 3 mois. Leptospirose : une 2ème injection 2 à 4 semaines avant ou après l'injection de ENDURACELL LR est nécessaire avec un vaccin contenant les leptospires de la gamme ENDURACELL. Rappel : Annuel (ENDURACELL LR).
ENDURACELL R MONO, Suspension injectable	ZOETIS FRANCE	Nationale 22/06/1988	virus rabique	Bovins, Caprins, Chat, Chien, Equins, Ovins	Bien agiter le flacon avant utilisation. L'injection doit être réalisée sur une zone de peau propre et sèche, en prenant les précautions aseptiques contre la contamination. Administer une dose de 1 ml par voie sous-cutanée quels que soient l'âge et l'espèce selon le schéma suivant : - Primovaccination : 1 dose à partir de l'âge de 3 mois. - Rappel : annuel.
EURICAN CHPLR, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable	MERIAL	Nationale 16/07/1987	adenovirus canin, leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, parvovirus canin, virus de la maladie de carré, virus rabique	Chien	Utiliser pour l'injection du matériel stérile et dépourvu de toute trace d'antiseptique et/ou de désinfectant. Respecter les conditions habituelles d'asepsie. Une dose de 1 ml par voie sous-cutanée, selon les modalités suivantes : Primovaccination : Une injection : à partir du 3ème mois d'âge. Une injection : un mois avant ou après avec un vaccin MERIAL contre les leptospiroses. Rappels : annuels. En cas de risque épidémiologique important de leptospirose, un rappel semestriel est recommandé.
EURICAN CHPPi2-LR, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable	MERIAL	RM, FR=EMR 13/05/2005	adenovirus canin, leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, parvovirus canin, virus de la maladie de carré, virus parainfluenza canin, virus rabique	Chien	Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée selon les modalités suivantes : Primovaccination : Une injection avec EURICAN CHPPi2-LR à partir de la 12ème semaine d'âge, 3 à 5 semaines avant ou après l'injection du vaccin EURICAN CHPPi2-L. - Rappels : Annuels.

En date du 20 février 2015

Liste des vaccins antirabiques autorisés en France

EURICAN LR, Suspension injectable	MERIAL	Nationale 16/07/1987	leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, virus rabique	Chien	Utiliser pour l'injection du matériel stérile et dépourvu de toute trace d'antiseptique et/ou désinfectant. Respecter les conditions habituelles d'asepsie. Une dose de 1 ml par voie sous-cutanée selon les modalités suivantes : Primovaccination Une injection : à partir du 3ème mois d'âge. Une injection : 1 mois avant ou après avec un vaccin MERIAL contre les leptospiroses. Rappels : Annuels. En cas de risque épidémiologique important de leptospirose, un rappel semestriel est recommandé.
FELIGEN CRP/R, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable	VIRBAC	Nationale 15/02/1988	calicivirus félin, herpesvirus félin, parvovirus félin, virus rabique	Chat	Reconstituer le vaccin en mélangeant le lyophilisat et la suspension. Agiter doucement et administrer immédiatement. Administrer une dose de vaccin par voie sous-cutanée selon le schéma vaccinal ci-dessous : Primo-vaccination : Une première injection de FELIGEN CRP à partir de l'âge de 8/9 semaines Une deuxième injection de FELIGEN CRP/R 3 à 4 semaines plus tard. Rappels : Annuels avec une dose unique.
NOBIVAC RAGE, Suspension injectable	INTERVET	Nationale 03/04/1985	virus rabique	Bovins, Chat, Chien, Equins	1 dose de 1 ml, par voie intramusculaire ou sous-cutanée. Chiens et chats : - Primo-vaccination à partir du 3ème mois, une injection de 1 ml. - Rappel annuel : une injection de 1 ml. Bovins et équins : - Primo-vaccination à partir du 6ème mois, une injection de 1 ml. - Rappel annuel : une injection de 1 ml.
QUADRICAT, Lyophilisat et émulsion pour émulsion injectable	MERIAL	Nationale 15/02/1988	calicivirus félin, herpesvirus félin, parvovirus félin, virus rabique	Chat	Reconstituer le vaccin par reprise du lyophilisat à l'aide de l'émulsion fournie. Injecter une dose de 1 ml, par voie sous-cutanée, selon les modalités suivantes : Primovaccination : - Une injection : après 3 mois d'âge avec QUADRICAT. - Une injection : 1 mois avant ou après celle de QUADRICAT avec le vaccin MERIAL contre la calicivirose et la rhinotrachéite virale du chat. Rappels :- Annuels
RABIGEN MONO, Suspension injectable	VIRBAC	Nationale 26/01/1987	virus rabique	Chat, Chien, Equins	Administrer par injection sous-cutanée (chiens et chats) ou intramusculaire (équins) une dose de vaccin de 1 ml selon le schéma vaccinal suivant : Primo-vaccination Chiens et chats : 1 dose à partir de 3 mois d'âge Equins : 1 dose à partir de 6 mois d'âge. Vaccination de rappel Chiens, chats, équins : une injection annuelle
RABIGEN MULTI, Suspension injectable	VIRBAC	Nationale 20/05/2010	virus rabique	Chat, Chien, Equins	Administrer par injection sous-cutanée (chiens et chats) ou intramusculaire (équins) une dose de vaccin de 1 ml selon le schéma vaccinal suivant : Primo-vaccination Chiens et chats : 1 dose à partir de 3 mois d'âge Equins : 1 dose à partir de 6 mois d'âge. Vaccination de rappel Chiens, chats, équins : une injection annuelle

En date du 20 février 2015

Liste des vaccins antirabiques autorisés en France

<p>RABISIN, Suspension injectable</p>	<p>MERIAL</p>	<p>Nationale 07/01/1981</p>	<p>virus rabique</p>	<p>Bovins, Chat, Chien, Equins, Furet, Ovins</p>	<p>Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée (excepté chez les équins) ou par voie intramusculaire selon le calendrier suivant :</p> <p>Chiens, chats : Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 12 semaines* Rappels : 1 an après la primo vaccination. Puis, à intervalle de 3 ans maximum**</p> <p>Furets Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 3 mois Rappels : Annuels</p> <p>Chevaux De — de 6 mois Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 4 mois*** suivie d'une 2ème injection 1 mois plus tard Rappels : Annuels De + de 6 mois Primo-vaccination : 1 injection Rappels : Annuels</p> <p>Bovins, ovins De - de 9 mois Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 4 mois*** suivie d'une 2ème injection entre 9 et 12 mois d'âge Rappels : Annuels</p> <p>De + de 9 mois Primo-vaccination : 1 injection Rappels : Annuels</p> <p>* Dans le cas d'un chien ou d'un chat vacciné avant l'âge de 12 semaines, le schéma de primo-vaccination devrait être complété par une injection à 12 semaines d'âge ou plus tard. ** Dans tous les cas, l'intervalle entre les rappels doit respecter la réglementation en vigueur dans le pays. *** Dans le cas où un cheval, un bovin ou un ovin est vacciné avant l'âge de 4 mois, le schéma de primo-vaccination devrait être complété par une injection faite à 4 mois d'âge ou plus tard.</p>
---	---------------	---------------------------------	----------------------	--	---

Liste des vaccins antirabiques autorisés en France

<p>RABISIN MULTI, Suspension injectable</p>	<p>MERIAL</p>	<p>Nationale 06/04/2010</p>	<p>virus rabique</p>	<p>Bovins, Chat, Chien, Equins, Furet, Ovins</p>	<p>Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée (excepté chez les équins) ou par voie intramusculaire selon le calendrier suivant :</p> <p>Espèces Primo-vaccination Rappels</p> <p>Chiens, chats 1 injection à partir de l'âge de 12 semaines*1 an après la primo-vaccination. Puis, à intervalle de 3 ans maximum**</p> <p>Furets 1 injection à partir de l'âge de 3 mois Annuels</p> <p>Chevaux De 6 mois 1 injection à partir de l'âge de 4 mois*** suivie d'une 2ème injection 1 mois plus tard Annuels</p> <p>De + de 6 mois 1 injection</p> <p>Bovins, ovins De - de 9 mois 1 injection à partir de l'âge de 4 mois*** suivie d'une 2ème injection entre 9 et 12 mois d'âge Annuels</p> <p>De + de 9 mois 1 injection</p> <p>* Dans le cas d'un chien ou d'un chat vacciné avant l'âge de 12 semaines, le schéma de primo-vaccination devrait être complété par une injection à 12 semaines d'âge ou plus tard.</p> <p>** Dans tous les cas, l'intervalle entre les rappels doit respecter la réglementation en vigueur dans le pays.</p> <p>*** Dans le cas où un cheval, un bovin ou un ovin est vacciné avant l'âge de 4 mois, le schéma de primo-vaccination devrait être complété par une injection faite à 4 mois d'âge ou plus tard.</p>
<p>VANGUARD R, Solution injectable</p>	<p>ZOETIS FRANCE</p>	<p>RM, FR=EMC 09/05/2006</p>	<p>virus rabique</p>	<p>Bovins, Caprins, Chat, Chien, Equins, Furet, Ovins, Porc charcutier, Porc reproducteur</p>	<p>Posologie et voie d'administration: Agiter le flacon avant l'utilisation. L'administration d'une dose unique de 1 ml est suffisante quelque soit l'âge, le poids, ou la race de l'animal. Administrer par voie sous-cutanée ou intramusculaire.</p> <p>Primo-vaccination: Les animaux de toutes les espèces cibles peuvent être vaccinés à partir de 12 semaines d'âge. La primo-vaccination est faite avec une dose unique de 1 ml de vaccin.</p> <p>Rappel: Les animaux doivent être revaccinés avec une dose de 1 ml de vaccin 1 an après la première vaccination. Après le premier rappel (administré 1 an après la primo-vaccination), les animaux doivent être revaccinés tous les 2 ans avec une dose de 1 ml de vaccin.</p> <p>Administration concomitante avec des vaccins canins de la gamme VANGUARD : Les vaccins VANGUARD doivent être reconstitués conformément aux données des Résumés des Caractéristiques des produits. Le flacon reconstitué doit être bien agité puis mélangé avec 1 ml de VANGUARD R, soit dans le flacon de VANGUARD R, soit dans la seringue. Bien agiter VANGUARD R avant emploi. Les vaccins mélangés doivent être agités doucement puis administrés immédiatement par voie sous-cutanée.</p>

En date du 20 février 2015

Liste des vaccins antirabiques autorisés en France

<p>VERSICAN DHPPi/L3R LYOPHILISAT ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE POUR CHIENS, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable</p>	<p>ZOETIS FRANCE</p>	<p>RM, FR=EM 30/01/2012C</p>	<p>adenovirus canin, leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg grippotyphosa, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, parvovirus canin, virus de la maladie de carré, virus parainfluenza canin, virus rabique</p>	<p>Chien</p>	<p>Dosage et voie d'administration : Reconstituer de façon aseptique un flacon de lyophilisat avec le contenu d'un flacon de solvant. Bien agiter et injecter immédiatement tout le contenu du flacon reconstitué (1 ml) par voie sous-cutanée. Primo-vaccination : 2 doses du vaccin à 2 à 4 semaines d'intervalle. La première dose peut être administrée à partir de 8 semaines d'âge. La seconde dose ne doit pas être administrée avant 12 semaines d'âge. L'efficacité de la fraction rage a été montrée après administration d'une seule dose à partir de 12 semaines d'âge. La première dose peut donc être administrée avec le vaccin compatible VERSICAN DHPPi/L3 si une seule dose est souhaitée pour la rage (voir le RCP de VERSICAN DHPPi/L3). Rappel : Un rappel annuel avec une dose unique de VERSICAN DHPPi/L3R est recommandé.</p>
<p>VERSICAN L3R SUSPENSION INJECTABLE POUR CHIENS, Suspension injectable</p>	<p>ZOETIS FRANCE</p>	<p>RM, FR=EMC 04/10/2012</p>	<p>leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg grippotyphosa, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, virus rabique</p>	<p>Chien</p>	<p>Dosage et voie d'administration : Injecter tout le contenu du flacon (1 ml) par voie sous-cutanée. Ne pas utiliser de seringues ou d'aiguilles stérilisées chimiquement, ceci pouvant interférer avec l'efficacité du vaccin. Primo-vaccination : 2 doses du vaccin à 2 à 4 semaines d'intervalle. La première dose peut être administrée à partir de 8 semaines d'âge. La seconde dose ne doit pas être administrée avant 12 semaines d'âge. L'efficacité de la fraction rage a été montrée après administration d'une seule dose à partir de 12 semaines d'âge. La première dose peut donc être administrée avec le vaccin compatible VERSICAN DHPPi/L3 ou VERSICAN L3 si une seule dose est souhaitée pour la rage (voir le RCP de VERSICAN DHPPi/L3 et VERSICAN L3). Schéma de revaccination : Une dose unique du vaccin devra être administrée annuellement par la suite.</p>
<p>PUREVAX RABIES, Suspension injectable</p>	<p>MERIAL</p>	<p>Centralisée 18/02/2011</p>	<p>virus rabique</p>	<p>Chat</p>	<p>Voie sous-cutanée. Administrer une dose de 1 ml, selon le schéma de vaccination suivant : Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 12 semaines. Rappel : 1 an après la primovaccination, puis à 3 ans maximum d'intervalle. Voyages dans des pays exigeant un test sérologique de la rage : l'expérience a montré que certains animaux vaccinés, bien que protégés, ne présentent pas le taux d'anticorps de 0.5 UI/ml requis par certains pays. Les vétérinaires praticiens peuvent alors envisager deux vaccinations. Le meilleur moment pour effectuer la prise de sang est environ 28 jours après la vaccination.</p>

En date du 20 février 2015

Liste des vaccins antirabiques autorisés en France

<p>VERSICAN PLUS DHPPi/L4R LYOPHILISAT ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE POUR CHIENS, Poudre et solvant pour suspension injectable</p>	<p>ZOETIS BELGIUM</p>	<p>Centralisée 07/05/2014</p>	<p>adenovirus canin, leptospira interrogans sg australis, leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg grippotyphosa, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, parvovirus canin, virus de la maladie de carré, virus parainfluenza canin, virus rabique</p>	<p>Chien</p>	<p>Voie sous-cutanée. Dose et voie d'administration : Reconstituer de façon aseptique le lyophilisat avec le solvant. Bien agiter et administrer immédiatement tout le contenu (1 ml) du produit reconstitué. Le vaccin reconstitué : couleur rose / rouge , ou jaune avec une légère opalescence. Schéma de primo-vaccination : Deux doses de Versican Plus DHPPi/L4R à 3-4 semaines d'intervalle à partir de 8-9 semaines d'âge. La seconde dose ne doit pas être administrée avant 12 semaines d'âge.</p> <p>Rage : L'efficacité de la fraction de la rage est prouvée, après une seule dose à 12 semaines d'âge dans les études de laboratoire. Par conséquent, la première dose peut être administrée avec Versican Plus DHPPi/L4. Dans ce cas, la deuxième vaccination avec Versican Plus DHPPi/L4R ne doit pas être administrée avant 12 semaines. Cependant, dans les études terrain, 10 % des chiens séronégatifs n'ont pas montré de séroconversion (> 0,1 UI / ml) 3-4 semaines après une seule primo-vaccination contre la rage. De plus, 17 % des chiens n'atteignent pas non plus le titre de 0,5 UI / ml d'anticorps contre la rage demandé par certains pays non membres de l'UE pour y voyager. En cas de voyage à destination de zones à risque ou en cas de voyage en dehors de l'UE, les vétérinaires qui le souhaitent pourront réaliser une primo-vaccination en deux doses, y compris contre la rage ou effectuer une vaccination supplémentaire contre la rage après 12 semaines. En cas de besoin, les chiens de moins de 8 semaines peuvent être vaccinés car l'innocuité du produit a été démontrée chez les chiens âgés de 6 semaines.</p> <p>Re-vaccination : Une dose unique de Versican Plus DHPPi/L4R à administrer annuellement.</p>
--	-----------------------	-----------------------------------	--	--------------	--

Liste des vaccins antirabiques autorisés en France

<p>VERSICAN PLUS Pi/L4R LYOPHILISAT ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE POUR CHIENS, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable</p>	<p>ZOETIS BELGIUM</p>	<p>Centralisée 31/07/2014</p>	<p>leptospira interrogans sg bratislava, leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg grippotyphosa, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, virus parainfluenza canin, virus rabique</p>	<p>Chien</p>	<p>Voie sous-cutanée. Dose et voie d'administration : Reconstituer de façon aseptique le lyophilisat avec le solvant. Bien agiter et administrer immédiatement tout le contenu (1 ml) du produit reconstitué. Vaccin reconstitué : couleur rose/rouge ou jaunâtre, avec une légère opalescence. Schéma de primo-vaccination : Deux doses de Versican Plus Pi/L4 R à 3-4 semaines d'intervalle à partir de 8-9 semaines d'âge. La seconde dose ne doit pas être administrée avant 12 semaines d'âge. Rage : L'efficacité de la fraction rage est prouvée, après une seule dose à 12 semaines d'âge dans les études de laboratoire. La première dose peut donc être administrée avec Versican Plus Pi/L4. Dans ce cas, la seconde vaccination avec Versican Plus Pi/L4R ne doit pas être administrée avant 12 semaines. Cependant, dans les études terrain 10 % des chiens séronégatifs n'ont pas montrés de séroconversion (> 0,1 UI / ml) 3-4 semaines après une seule primo-vaccination contre la rage . De plus, 17 % des chiens n'atteignent pas non plus le titre de 0,5 UI / ml d'anticorps contre la rage demandé par certains pays non membres de l'UE pour y voyager. En cas de voyage à destination de zones à risque ou en cas de voyage en dehors de l'UE, les vétérinaires qui le souhaitent pourront réaliser une primo-vaccination en deux doses, y compris contre la rage ou effectuer une vaccination supplémentaire contre la rage après 12 semaines. En cas de besoin, les chiens de moins de 8 semaines peuvent être vaccinés car l'innocuité de Versican Plus Pi/L4R a été démontrée chez les chiens de 6 semaines. Rappel : Une dose unique de Versican Plus Pi/L4 R à administrer annuellement.</p>
---	-----------------------	-----------------------------------	---	--------------	--